



# ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ (РАБОТ)

## I. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1997 года, Гражданского кодекса РФ, ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 года, Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями от 13.01.1996 года.

1.2. Настоящие правила разработаны в связи с отсутствием на федеральном и региональном законодательных уровнях утвержденных правил пользования стоматологическими услугами (работами), а также в связи с тем фактом, что результаты оказываемых медицинских услуг зависят в равной степени от действий врача и действий самого пациента, в частности, от того, насколько пациент заботиться о своем здоровье, соблюдает режим лечения, рекомендации и назначения лечащих врачей.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах:

**Клиника** – Исполнитель по договору на оказание стоматологических услуг;

**Пациент** – физическое лицо, которому предоставляется медицинская услуга, либо которое обратилось за предоставлением медицинской услуги, Потребитель, или Заказчик медицинской услуги;

**Стоматологические услуги** – медицинские манипуляции, имеющие своей целью диагностику, лечение, профилактику стоматологических заболеваний, результат которых нематериален, потребляется в процессе их оказания.

**Под стоматологическими услугами понимаются:**

- обработка и пломбирование корневых каналов (эндодонтическое лечение);
- профессиональная гигиена полости рта;
- наложение временной повязки, временной пломбы;
- амбулаторные хирургические операции;
- установка имплантата;
- лечение заболеваний пародонта;
- ортодонтическое лечение;
- отбеливание зубов.

Для того чтобы фактический результат лечения соответствовал прогнозу лечения, пациент должен соблюдать правила пользования услугами.

**Стоматологические работы** – медицинские манипуляции, нацеленные на диагностику, лечение, профилактику стоматологических заболеваний, имеющие материальный (вещественный) результат, который способен сохранять свои физические (потребительские) свойства в течение установленного гарантийного срока.

**Под стоматологическими работами понимаются:**

- прямые композитные реставрации (пломбы);
- непрямые реставрации (вкладки, виниры);
- протезы съемные и несъемные;
- съемные ортодонтические аппараты;
- ретейнеры.

прополоскать рот водой и смазывать десну возле зуба гелем для слизистых оболочек «Актовегин» или «Метрогил Дента» в течение 3 дней после каждого приёма пищи.

### Рекомендации пациенту после лечения глубокого кариеса

1. Возможен дискомфорт после анестезии. На верхней челюсти онемение может длиться в течение 1-2 часов, на нижней челюсти значительно дольше в течение 2-4 часов, в зависимости от ваших анатомических особенностей. Не принимайте пищу, пока не прошло онемение после анестезии (обезболивания), чтобы не прикусить нечувствительные мягкие ткани губ, щеки, языка. После анестезии возможны: отёк мягких тканей, кровоизлияние (гематома, синяк) в месте вкота. В данной ситуации рекомендуется приложить холод на 15 минут.
2. После постановки анестезии возможно снижение внимания. Мы рекомендуем: не садиться за руль или быть внимательным к ситуации на дороге.
3. Могут возникнуть отсроченные аллергические реакции на анестетик в виде отёка лица, языка, сыпи. Мы рекомендуем: выпить таблетку «Супрастина» и обязательно позвонить лечащему доктору, при нарастающем отёке - вызвать скорую помощь.
4. Возможна травматизация десны, так как для восстановления правильной анатомической формы зуба используются матрицы и специальные нити, которые вводятся под десну. После постановки пломбы (выполнения реставрации), её обязательно полируют, что также может травмировать десневой край. Мы рекомендуем: почистить зубы, прополоскать рот водой и смазывать десну возле зуба гелем для слизистых оболочек «Актовегин» или «Метрогил Дента» в течение 3 дней после каждого приёма пищи.
5. В первые несколько дней после лечения старайтесь не надкусывать и не разжевывать твердую пищу на стороне пролеченного зуба, не употребляйте очень холодные, горячие напитки и пищу.
6. Если после анестезии не полностью восстановилась чувствительность какой-либо области, то вы должны обязательно обратиться за советом к врачу.
7. После прекращения действия анестезии пломба (реставрация) может мешать при смыкании зубов, так как во время подгонки по прикусу из-за действия анестезии Вы не могли полноценно её ощущать. Мы рекомендуем записаться на коррекцию пломбы (без оплаты) для восстановления комфорта, это займет не более 10 минут.
8. Пролеченный зуб может реагировать на температурные раздражители в течение недели, с ежедневным снижением болевой интенсивности. Если боль усиливается, принимает ночной или приступообразный характер, рекомендуем обратиться к лечащему врачу. Скорее всего, воспаление затронуло пульпу (нерв) зуба и необходимо лечение пульпита (удаление сосудисто-нервного пучка и пломбирование корневых каналов зуба). В этом случае потребуется снять поставленную пломбу, пролечить зубные каналы и сделать новую реставрацию.
9. До посещения врача можно принять любое обезболивающее средство, которое Вы принимаете обычно, например, «Нурофен» или «Нимесил».
10. Через три месяца после лечения зуба с диагнозом глубокий кариес Вам необходимо прийти на контрольный осмотр к своему лечащему врачу. Он проведет осмотр и диагностику, для того, чтобы оценить результат проведенного лечения, определить жизнеспособность пульпы и предотвратить развитие осложнений.

**НЕ рекомендуется:** ходить с временной пломбой более 3 недель, так как может нарушиться герметизм временной пломбы, и микроорганизмы из полости рта проникнуть в каналы в результате чего, может потребоваться повторная обработка каналов, благоприятный прогноз лечения снижается. Так же под временной пломбой часто находятся тонкие стенки зуба, которые могут скальваться.

### Рекомендации пациенту после лечения периодонтита

1. Возможен дискомфорт после анестезии. На верхней челюсти онемение может длиться в течение 1-2 часов, на нижней челюсти значительно дольше в течение 2 - 4 часов, в зависимости от ваших анатомических особенностей. Не принимайте пищу, пока не прошло онемение после анестезии (обезболивания), чтобы не прикусить нечувствительные мягкие ткани губ, щеки, языка. После анестезии возможны: отёк мягких тканей, кровоизлияние (гематома, синяк) в месте вкола. В данной ситуации рекомендуется приложить холод на 15 минут.
2. После постановки анестезии возможно снижение внимания. Мы рекомендуем: не садиться за руль или быть внимательным к ситуации на дороге.
3. Могут возникнуть отсроченные аллергические реакции на анестетик в виде отёка лица, языка, синус. Мы рекомендуем: выпить таблетку «Супрастина» и обязательно позвонить лечащему доктору, при нарастающем отёке - вызвать скорую помощь.
4. Если после анестезии не полностью восстановилась чувствительность какой-либо области, то вы должны обязательно обратиться за советом к врачу.
5. В первые несколько дней после лечения старайтесь не надкусывать и не разжевывать твердую пищу на стороне пролеченного зуба.
6. После того, как действие анестезии закончилось, вы можете ощущать небольшую ноющую боль в зубе и дискомфорт при накусывании в течение недели – это нормально, так как каналы зуба обрабатывались механическими инструментами и антисептическими растворами, а затем пломбировались. В этом случае, мы рекомендуем выпить таблетку нестероидного противовоспалительного, обезболивающего средства, которое Вы обычно принимаете (например, «Нурофен» или пакетик «Нимесил» - 2 раза в день после еды)
7. Полость в зубе после лечения корневых каналов закрыта временной пломбой. Временная пломба твердеет в течение 2 часов, пожалуйста, не принимайте пищу в этот период. Она может крошиться, но не должна выпасть полностью. Внимательно посмотрите, если пломбы нет (выпала), то необходимо обратиться к врачу для повторной постановки пломбы (без оплаты), так как от этого зависит прогноз и результат лечения этого зуба.
8. Возможна травматизация десны, так как для лечебного пульпита используется специальная изоляция, которая надевается на больной зуб и защищает полость рта от агрессивного воздействия применяемых антисептиков. При восстановлении правильной анатомической формы зуба используются матрицы и специальные нити, которые вводятся под десну. После постановки пломбы, её обязательно полируют, что также может травмировать десневой край. Если десна травмирована, то мы рекомендуем: почистить зубы, прополоскать рот водой и смазывать десну возле зуба гелем для слизистых оболочек «Актовегин» или «Метрогил Дента» в течение 1-7 дней после каждого приема пищи.
9. Возможен дискомфорт после постановки пломбы: пломба может менять при смыкании зубов. Мы рекомендуем записаться на коррекцию пломбы (без оплаты) для восстановления комфорта, это займет не более 10 минут.

6. Если после анестезии не полностью восстановилась чувствительность какой-либо области, то вы должны обязательно обратиться за советом к врачу.

7. После того, как действие анестезии закончилось, вы можете ощущать небольшую ноющую боль в зубе и дискомфорт при накусывании в течение недели – это нормально, так как каналы зуба обрабатывались механическими инструментами и антисептическими растворами. Мы рекомендуем выпить таблетку нестероидного противовоспалительного средства, обезболивающего средства, которое Вы принимаете обычно (например, «Нурофен» или «Нимесил» - 1 пакетик).

8. Временная пломба твердеет в течение 2 часов, пожалуйста, не принимайте пищу в этот период. Она может крошиться, но не должна выпасть полностью. Внимательно посмотрите, если пломбы нет (выпала), то нужно необходимо обратиться к врачу для повторной постановки пломбы (без оплаты), так как от этого зависит прогноз и результат лечения этого зуба.

**ВАЖНО:** не рекомендуется ходить с временной пломбой более 3 недель, так как может нарушиться герметизм временной пломбы, и микроорганизмы из полости рта проникнуть в каналы в результате чего, может потребоваться повторная обработка каналов, и благоприятный прогноз лечения снижается. Так же под временной пломбой часто находятся тонкие стенки зуба, которые могут скалываться.

9. Если в это же посещение поставили постоянную пломбу. Возможен дискомфорт после постановки пломбы. Пломба может мешать по прикусу, так как во время подгонки по прикусу вы были под действием анестезии и не могли до конца её чувствовать. Мы рекомендуем: записаться на пришлифовку пломбы (без оплаты) - это займет не более 10 минут.

**НЕЛЬЗЯ:** греть щёку в области пролеченного зуба, полоскать спиртосодержащими растворами полость рта и принимать их внутрь, прикладывать чеснок, сало, посещать бассейн и сауны, физические нагрузки в течение 7 дней, переохлаждаться, самостоятельно убирать временную пломбу!

**НЕ должно быть:** увеличения отёка, повышения температуры выше 38 С, сильной боли. В данных случаях мы рекомендуем обратиться сразу же к врачу.

### Рекомендации по использованию временных коронок, протезов

Процесс изготовления постоянной конструкции (коронки, протеза) в зубо-технической лаборатории занимает определенное время. Поэтому на этот период фиксируется временная коронка или протез. Цвет и форма временной конструкции могут не соответствовать цвету и форме постоянного протеза. Кроме того, цвет может изменяться и в процессе эксплуатации (от курения, пищевых красителей). Временные конструкции обязательно должны быть заменены на постоянные.

Временные коронки, протезы выполняют ряд полезных функций:

- сохраняют эстетику улыбки
- защищают обточенный зуб от сколов, скопления бактериального налета; при протезировании «живых» (не депульпированных) зубов защищают нерв зуба от температурных и химических раздражителей, предотвращая развитие воспаления пульпы

9. При наличии острой и постоянной боли, вызванной натиранием конструкции, плохой фиксации конструкции, необходимо обратиться к врачу для коррекции конструкции.

### Рекомендации пациенту после установки несъемных протезов

1. Несъемные зубные протезы необходимо чистить зубной щеткой с пастой так же, как естественные зубы, два раза в день. Дополнительно можно пользоваться ирригатором, который позволит очистить щели между коронками, зубами, а также зубной нитью и зубными ершиками (по показаниям). После еды следует полоскать рот для удаления остатков пищи. При возникновении кровоточивости при чистке зубов нельзя прекращать гигиенические процедуры. Если кровоточивость не исчезла в течение 3-7 дней, необходимо обратиться в клинику к врачу-ортопеду.

2. Если протез зафиксирован на временный цемент, не рекомендуется жевать жевательную резинку, ириски и другие вязкие продукты, с осторожностью пользоваться зубной нитью.

3. Во избежание поломки протеза, скола облицовочного материала, а также повреждения слизистой оболочки полости рта не рекомендуется принимать и пережевывать очень жесткую пищу (например, сухари, карамель, кости), откусывать от больших кусков (например, яблока). Нужно разрезать или разделять продукты на небольшие кусочки – это касается овощей, фруктов, мяса и пр..

Откажитесь от семечек – по крайней мере, чистите их вручную, а пережевывайте боковыми зубами,

4. При скоплении пищи под протезом (искусственным зубом) следует пользоваться флоссом с утолщенной средней частью.

5. Безотлагательно обращайтесь к своему лечащему врачу в следующих случаях:

- при нарушении фиксации несъемного протеза. Признаками нарушения фиксации могут быть «хлюпанье» протеза, неприятный запах изо рта;
- при появлении болезненных ощущений в области коронок, воспаления десны вокруг коронок (кровоточивость десны);
- при нарушении смыкания, завышении прикуса в области коронок;
- при выпадении коронок, в случаях скола керамики.

### Рекомендации пациенту после удаления зуба

1. Удалить тампон через 15- 30 минут.

2. Принимать только мягкую негорячую пищу в течение первых суток.

3. Если из лунки удалённого зуба кровит, приложите к щеке холод на 20 мин. 2 раза с перерывом 30 мин., не подсасывайте кровь из раны (если кровь не остановилась обязательно сообщите об этом в клинику).

4. Обязательно соблюдайте гигиену полости рта, возле удалённого зуба аккуратно чистите щёткой. Касаться зубной щёткой области лунки можно только после её заживления (не ранее, чем через две недели после удаления). Полоскать рот после чистки зубов в этот период следует осторожно: набрав в рот воды, наклонять голову в разные стороны и затем сплюнуть. Не используйте не рекомендованные врачом антисептики и др. растворы. Хорошая

2. Самостоятельно не убирайте гемостатическую губку, она сама должна рассосаться. Если гемостатическая губка сама выпала и боли вас больше не беспокоят, то ставить больше её не надо. Если ноющие боли все же есть, то нужно обратиться к врачу и поставить губку вновь.

3. Обязательно соблюдайте гигиену полости рта, возле удалённого зуба аккуратно чистите щеткой.

3. Возможен дискомфорт после анестезии. На верхней челюсти онемение может длиться в течение 1-2 часов, на нижней челюсти значительно дольше в течение 2 -4 часов, в зависимости от ваших анатомических особенностей. Не принимайте пищу, пока не прошло онемение после анестезии (обезболивания), чтобы не прикусить нечувствительные мягкие ткани губ, щеки, языка.

4. После анестезии возможен: отёк мягких тканей, кровоизлияние в месте вколов. В данной ситуации рекомендуем приложить холод на 15 мин.

5. Снижение внимания. Мы рекомендуем: не садиться за руль или быть внимательным к ситуации на дороге.

6. Могут возникнуть отсроченные аллергические реакции на анестетик или антибиотики в виде отёка лица, языка, сини. Мы рекомендуем: выпить таблетку «Супрастина» и обязательно позвонить лечащему доктору, при нарастающем отёке - вызвать скорую помощь.

7. Если после анестезии не полностью восстановилась чувствительность какой-либо области, то вы должны обязательно обратиться за советом к врачу.

**ВАЖНО:** нельзя греть щёку в области больного зуба, полоскать спиртосодержащими растворами полость рта и принимать их внутрь, прикладывать чеснок, сало, посещать бассейн и сауны, физические нагрузки в течение 7 дней, переохлаждаться.

**НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ:** увеличения отёка, повышения температуры с выше 38С, сильной боли. В данных случаях мы рекомендуем сразу же обратиться к врачу.

#### Рекомендации пациенту после лоскутной операции

1. Не принимайте пищу и, желательно, не пейте в течение 2 часов после вмешательства.

2. В течение 2 часов прикладывайте холод к области вмешательства на 15 минут с интервалом в 15- 20 минут.

3. Ни в коем случае не полощите рот и исключите прием горячей пищи в течение первых суток после операции.

4. Не выполняйте тяжелой работы в этот день, исключите занятия спортом, посещение бассейна.

5. При болях можно принимать «Нурофен» по 1 таблетке 2 раза в день или «Немисил» по 1 пакетику 2 раза в день.

6. Обязательно после хирургического вмешательства посетите врача в назначенный день для контрольного осмотра.

#### Рекомендации пациенту, планирующему хирургическое стоматологическое лечение, в том числе, имплантацию зубов

1. В день хирургического стоматологического лечения рекомендуется принимать легкую пищу.

10. Во время сна постарайтесь не ложиться на подушку той стороной, на которой проведена операция.

11. Необходимо обязательно обратиться к врачу, если:

- у вас постоянные недомогания, отек или пульсирующие боли в течение нескольких дней после того как была проведена зубная имплантация.

- кровотечение возобновляется.

- ощущение онемения не проходит через 12 часов после операции

- появились симптомы или вопросы, о которых нет информации в ваших послеоперационных инструкциях.

12. В первые дни аккуратно чистите зубы в зоне операции. Не пользуйтесь ополаскивателями для ротовой полости в течение 8 часов после операции, так как это может вызвать кровотечение. Начните полоскание по истечении 8 часов после операции раствором, который прописал врач (6-8 раз в день в течении недели).

13. Швы снимают как правило на 7-10 день, иногда по усмотрению врача – на 20 день. Клиника применяет синтетические нити, которые хорошо держат операционный лоскут на месте, не инфицируются; не намокают, не разбухают. В леске есть один минус – острые края оставшейся нити могут мешать языку, немного колоться. Вы можете обильно нанести гель «Асепта адгезивная» на место шва. Далее следовать рекомендациям врача.

**Если у вас появятся следующие симптомы, следует сразу же обратиться к лечащему врачу:**

- резкая, пульсирующая самопроизвольная боль

- кровотечение в области проведённой операции

- появление значительного отёка слизистой оболочки в области установленного импланта

- повышение температуры тела

- выраженное онемение губы, подбородка, зубов на следующий день после операции

Если возникнет дискомфорт, которого быть не должно, или который не пройдёт в положенное время-звоните к нам в клинику. врач примет Вас бесплатно.

Регулярная и тщательная гигиена полости рта имеет важнейшее значение для успешного заживления и сохранения имплантов, можно использовать обычные щётки и пасты, рекомендованные Вам стоматологом.

По завершении процесса остеointеграции (приживления) импланта возникает необходимость в создании правильной линии десны, поэтому вторым этапом является установка ФДМ (формирователя десневой манжеты), обычно через 4-6 месяцев после установки импланта. Еще через 15-30 дней стоматолог приступает к снятию слепков и изготовлению постоянного протеза.

### Рекомендации пациенту после отбеливания

1. После отбеливания могут возникнуть отсроченные аллергические реакции в виде отёка лица, языка, сыпи. Мы рекомендуем: выпить таблетку «Супрастина» и обязательно позвонить в клинику лечащему доктору, при нарастающем отёке - вызвать скорую помощь.

2. Так же после отбеливания возможна повышенная чувствительность зубов – это нормально. Если боль достаточно сильная, то мы рекомендуем выпить 1 таблетку

3. В течение 2 дней после гигиены воздержитесь от курения, употребления продуктов, которые способствуют повышению чувствительности зубов (соки, газированные напитки, фрукты, мороженое), от употребления красящих продуктов:

- кофе, крепкий чай, кола, красное вино, ягоды, какао, шоколад;
- ягоды (черника, ежевика и др.), свекла, морковь, томаты и томатный сок;
- кетчуп, бальзамический уксус, соевый соус, горчица и карри;
- любые другие продукты, цвет которых бросается в глаза.

4. Соблюдайте гигиену полости рта: используйте флосс (зубную нить) и зубные щетки для очистки межзубных промежутков, качественную зубную щетку и пасту, ирригатор. Гигиенические процедуры желательно проводить после каждого приема пищи, минимум - дважды в день. Первые дни после гигиены рекомендуется чистить зубы мягкой зубной щеткой (Soft), через 7 дней можно переходить на щетку зубов щетками средней жесткости.

5. Для профилактики стоматологических заболеваний необходимо включить в свой рацион больше твердой пищи (морковь, яблоки, капуста).

6. Регулярные визиты к врачу для поддержания результатов лечения зубов, удаления зубного камня или бактериального налета и контроля гигиены необходимо проводить не менее одного раза в полгода. Пациентам, которые лечатся с помощью ортодонтических конструкций, требуется проведение профессиональной гигиены каждые 3-4 месяца.

#### Рекомендации пациенту после художественной реставрации зубов

1. Возможен дискомфорт после анестезии. На верхней челюсти онемение может длиться в течение 1-2 часов, на нижней челюсти значительно дольше в течение 2-4 часов, в зависимости от ваших анатомических особенностей. Не принимайте пищу, пока не прошло онемение после анестезии (обезболивания), чтобы не прикусить нечувствительные мягкие ткани губ, щеки, языка. После анестезии возможны: отёк мягких тканей, кровоизлияние (гематома, синяк) в месте вкота. В данной ситуации рекомендуется приложить холод на 15 минут.

2. После постановки анестезии возможно снижение внимания. Мы рекомендуем: не садиться за руль или быть внимательным к ситуации на дороге.

3. Могут возникнуть отсроченные аллергические реакции на анестетик в виде отёка лица, языка, синяки. Мы рекомендуем: выпить таблетку «Супрастина» и обязательно позвонить лечащему доктору, при нарастающем отёке - вызвать скорую помощь.

4. В первые сутки после реставрации надо воздержаться от твердых, требующих интенсивного разжевывания продуктов.

5. Если после анестезии не полностью восстановилась чувствительность какой-либо области, то вы должны обязательно обратиться за советом к врачу.

6. После прекращения действия анестезии пломба (реставрация) может мешать при смыкании зубов, так как во время подгонки по прикусу из-за действия анестезии Вы не могли полноценно её ощущать. Мы рекомендуем записаться на коррекцию пломбы для восстановления комфорта, это займет не более 10 минут.

7. В первые дни соблюдайте «белую» диету (светлые бульоны, яйца, мясо, молочные продукты, вода). Некоторые напитки и продукты, средства гигиены способны изменить цвет реставрации, поэтому в течение трех суток не рекомендуется:

6. В случаях отклейки брекета, щечной трубки, расцементировки ортодонтического кольца, необходимо сохранить его и немедленно связаться с лечащим врачом по вопросу приема. Необходимо обязательно сохранить отклеившийся элемент.

7. Самая важная рекомендация - необходимо посещать ортодонта в назначенное время с установленной регулярностью. Помните! Эффективность лечения зависит не только от врача, но и во многом – от самого пациента. За брекетами, как и за зубами, необходимо ухаживать, причем регулярно и тщательно, иначе в процессе могут возникнуть осложнения и лечение затянется, тем самым оттягивая результат.

### Рекомендации пациенту после снятия брекет-системы

Вам сняли брекет – систему, но на этом ортодонтическое лечение не закончено. Теперь наступил период удержания (фиксации, ретенции) зубов на новом месте и Вам необходимо носить специальный аппарат – ретейнер, закрепляющий ортодонтическое лечение.

Для того, чтобы Ваша улыбка оставалась красивой, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. Первые дни после установки ретейнера могут быть неприятные ощущения для языка, плохое произношение некоторых звуков. Следует тренироваться, больше разговаривать и проговаривать слова.
2. В день снятия брекетов или в ближайшее время необходимо обратиться к стоматологу /гигиенисту за профессиональной чисткой и фторированием зубов. Это позволит эмали зубов и дёснам восстановиться после долгого лечения, при необходимости пролечить зубы.
3. Не забывайте чистить зубы два раза в день, после завтрака и после ужина, избегая горизонтальных движений, которые были необходимы во время лечения. Все движения должны быть вертикальными от десны к краю зуба, без излишнего надавливания.
4. Посещайте врача-ортодонта для контрольных осмотров 1 раз в 6-8 месяцев.
5. Первые 6 месяцев являются критическим периодом, поэтому нужно быть особо внимательными. В случае появления подвижности зубов, ощущения острых углов или неприятного хруста, необходимо в безотлагательно записаться на прием!
6. Делайте профессиональную чистку зубов в стоматологической клинике не реже одного раза в 6 месяцев. В случае, если самостоятельно не удается поддерживать хороший уровень гигиены, значит необходимо делать профгигиену чаще, чем 1 раз в 6 месяцев.
7. Если у Вас имеются дополнительные съемные ретейнеры, то Вам необходимо дополнительно уточнить способ и период их ношения (обычно: первые 12 месяцев на ночь каждый день, далее через день, через 2 дня, потом просто проверяем как садятся капы). Необходимо помнить, что несоблюдение правил пользования ретейнерами может привести к изменению положения зубов. И, как следствие, к повторному ортодонтическому лечению.

Внимание и уход за ретейнерами позволит Вам иметь здоровую и красивую улыбку долгие годы

стоматологических услуг и потребовать полного возмещения убытков (ст. 36 Закона РФ «О защите прав потребителей»), при условии, что отсутствует угроза для жизни и медицинская помощь может быть оказана в плановом порядке.

3.5. Клиника оставляет за собой право требовать подтверждения надлежащего соблюдения Пациентом правил пользования результатами стоматологических услуг (работ), вплоть до направления Пациента на экспертизу. При отказе от проведения экспертизы Пациент теряет право на гарантии.

*Пациент всегда должен помнить, что результат стоматологической услуги (длительность его сохранения) зависит в значительной степени от того, насколько он сам заботиться о своем здоровье в целом, и стоматологическом здоровье, в частности.*